

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

Extermination Terrebonne Inc.	450-477-3932	1-800-361-9474	www.exterminationterrebonne.com
Extermination Joliette Inc.	450-759-5901	1-800-361-9474	www.exterminationjoliette.com
Extermination St-Hubert Inc.	450-676-2358	1-800-361-9474	www.exterminationsthubert.com

STÉGOBIE DES PHARMACIES (Vrillete du paine)

Stegobium paniceum

APPARENCE

La stégobie, de forme ovale, est de couleur brun rouge et mesure de 2 mm à 4 mm de longueur. On la distingue du lasioderme du tabac par son antenne possédant une massue à trois articles et son élytre strié. Sa tête est recourbée vers l'avant, cachée par le thorax. La larve est une petite chenille blanche et velue et mesure de 3mm à 4mm de long.



ALIMENTATION

La stégobie des pharmacies mange une grande variété d'aliments, elle se nourrit d'une grande variété de produits séchés d'origine animale ou végétale tels les céréales et les produits céréaliers, les épices, le chocolat, les graines, la farine, le cuir, les oreillers en plumes et la nourriture pour chiens. Toutefois, malgré son régime alimentaire varié, elle préfère les matières végétales riches en amidon.

MŒURS

On la trouve le plus souvent dans des climats tempérés, où elle peut survivre en hiver dans des endroits non chauffés. Elle est introduite dans les maisons par les produits alimentaires déjà infestés, principalement par les épices comme le paprika.

REPRODUCTION

Sa durée de vie est courte : les mâles vivent 18 jours et les femelles, 30 jours. La femelle pond 100 œufs au cours de sa vie. La larve peut se développer en 40 jours dans des conditions optimales. Le cycle biologique complet peut prendre de cinq à six semaines.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

La larve cause le plus de dommages parce qu'elle se nourrit du produit. L'adulte ne se nourrit pas du produit, mais laisse de grands trous bien définis dans l'emballage lorsqu'il en émerge. L'adulte vole la nuit.