

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

Extermination Terrebonne Inc.	450-477-3932	1-800-361-9474	www.exterminationterrebonne.com
Extermination Joliette Inc.	450-759-5901	1-800-361-9474	www.exterminationjoliette.com
Extermination St-Hubert Inc.	450-676-2358	1-800-361-9474	www.exterminationsthubert.com

BLATTE

(voir les fiches qui suivent, spécifiques à certaines espèces)

APPARENCE

Il existe au moins 16 espèces de blattes au Québec. Six uniquement d'entre elles sont communes soit : La blatte germanique (environ ½ po, varie de dorée à noire mais généralement beige avec 2 bandes noires sur le pronotum), la blatte à bandes brunes (environ 12 mm/½ po, deux bandes brune qui traversent ses ailes), la blatte orientale (environ 2,5cm/1 po, brun foncé à noire), la blatte américaine (environ 4,5 cm/1 ¾ po, la plus grosse des blattes domestiques, brun rouge, pronotum brun jaunâtre présentant deux taches longues brunes), la blatte australienne (environ 3 cm/1 ¼ po, brun rouge à orangé avec deux grandes taches pâles, parfois réunies) et finalement la blatte de Pennsylvanie (environ 2 cm/¾ po, sa coloration est foncée, elle est indigène et elle habite les milieux boisés).



ALIMENTATION

Les blattes sont omnivores, elles peuvent manger autant de la matière végétale en décomposition que des animaux morts ou des restes de table. Dans nos maisons, elle se nourrissent de biscuits, de céréales, de fromage, de pâtes alimentaires, de nourriture d'animaux, de fruits, de viande, de légumes et aussi de tissus, de cuir, de poils, de colle, de savon, de rognures d'ongles, de cheveux et de particules de peau morte.

MŒURS

Les blattes sont nocturnes. Voir des blattes s'activer le jour est un indice qu'il y en a beaucoup. Elles peuvent se déplacer avec facilité d'un endroit à un autre par le biais des conduits d'aération, de chauffage, de plomberie, par les passages, les cages d'ascenseurs et elles peuvent aussi être transportées par mégarde.

REPRODUCTION

Les blattes qui habitent dans les maisons peuvent pondre tout au long de l'année. La durée de vie des adultes et celle du cycle vital, varient selon les espèces et les conditions environnementales, et plus particulièrement selon le degré de température. La blatte peut produire, selon l'espèce, 3 ou 4 générations par année, à raison de quelques dizaines d'œufs à la fois.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les blattes sont couramment appelées « coquerelles ». Certaines blattes peuvent vivre jusqu'à 190 jours sans nourriture et 40 jours sans eau. La blatte germanique a développé une résistance à plusieurs insecticides chimiques (organochlorés, organophosphorés, carbamates etc.) La majorité des espèces de blattes décrètent une substance qui a une odeur exécrable.

Description par espèce (les plus fréquentes au Québec)

Nom français	Nom scientifique	Longueur	Description
Blatte germanique 	<i>Blattella germanica</i>	10 à 16 (environ ½ po)	La plus commune dans les maisons. Coloration variant de dorée à noire, généralement brun pâle. Deux bandes noires allongées sur le pronotum. Ailes bien développées chez les deux sexes.
Blatte à bandes brunes 	<i>Supella longipalpa</i>	10 à 14 (environ ½ po)	Aussi appelée blatte des meubles. Rayée de deux bandes brun pâle qui traversent ses ailes. Ailes couvrant presque tout l'abdomen chez la femelle, parfois plus longues chez le mâle.
Blatte orientale 	<i>Blatta orientalis</i>	18 à 30 (environ 1 po)	Coloration brun foncé à noire. Ailes réduites chez les deux sexes, celles du mâle mieux développées que celles de la femelle (chez qui elles peuvent être absentes). Incapable de voler.
Blatte américaine 	<i>Periplaneta americana</i>	27 à 45 (env. 1 ¼ po)	Aussi appelée blatte d'Amérique. La plus grosse des blattes domestiques. Coloration brun rouge. Pronotum brun jaunâtre orné de deux grandes taches diffuses marron.
Blatte australienne 	<i>Periplaneta australasiae</i>	23 à 35 (env. 1 ¼ po)	Coloration sombre. Pronotum brun rouge à orangé orné de deux grandes taches distinctes, parfois réunies. Moins abondante que les blattes américaine et orientale.
Blatte de Pennsylvanie 	<i>Parcoblatta pennsylvanica</i>	12 à 19 (environ ¾ po)	Habite les milieux boisés. Coloration sombre. Bords du pronotum plus pâles. Ailes du mâle dépassant l'extrémité de l'abdomen. Ailes de la femelle couvrant les deux tiers de l'abdomen. Certains mâles atteignent 25 mm de long.