

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

Extermination Terrebonne Inc.	450-477-3932	1-800-361-9474	www.exterminationterrebonne.com
Extermination Joliette Inc.	450-759-5901	1-800-361-9474	www.exterminationjoliette.com
Extermination St-Hubert Inc.	450-676-2358	1-800-361-9474	www.exterminationsthubert.com

PYRALE INDIENNE DE LA FARINE

Plodia interpuctella

APPARENCE

Les adultes mesurent 15 à 28 mm d'envergure et 7,5 à 15 mm de longueur. À l'âge adulte, la pyrale de la farine se distingue facilement par sa grande taille et ses motifs. Les ailes antérieures et postérieures sont ornées de bandes courbes brun foncé et brun pâle entrecroisées de deux bandes blanches sinueuses. La chenille est blanchâtre, sans taches noires, avec la tête brune. À maturité, elle peut atteindre 20 à 25 mm de longueur.



ALIMENTATION

La pyrale de la farine infeste les denrées entreposées. Détritivore, elle est considérée comme un ravageur secondaire des produits céréaliers grossièrement moulus. À l'état larvaire, elle s'attaque aux grains de céréales (blé, orge, avoine, maïs), aux pois et aux haricots, à la farine, aux arachides, aux fruits séchés, aux pommes de terre, aux aliments mélangés pour animaux et aux céréales transformées. Les dommages ne sont pas distinctifs et résultent de l'alimentation des larves.

MŒURS

Elle se rencontre dans les silos à grain, les minoteries, les installations de transformation, les entrepôts, les navires céréaliers et les habitations. Les adultes volent principalement à l'aube et à l'aurore. Durant le jour, ils demeurent immobiles, perchés sur les murs ou sur d'autres surfaces des structures qu'ils infestent.

REPRODUCTION

Les femelles déposent au hasard 250 à 500 œufs sur la source de nourriture, par petits groupes isolés. Le développement larvaire jusqu'à maturité dure 42 à 56 jours. La pyrale de la farine peut produire plusieurs générations par année.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les larves peuvent perforer les emballages.